

مصرف داروهای آنتی بیوتیک برای

خطر حمله قلبی و سکته

حدود یک سوم افزایش



بررسی‌ها نشان می‌دهد زنانی که برای مدت زمان دو ماه یا بیشتر داروهای آنتی بیوتیک مصرف می‌کنند بیشتر در معرض حمله قلبی و سکته مغزی هستند.

مصرف داروهای آنتی بیوتیک برای مدت زمان بیش از دو ماه خطر حمله قلبی و سکته مغزی را در زنان حدود یک سوم افزایش خواهد داد.

به گفته گروهی از محققان آمریکایی مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها موجب از بین رفتن باکتری‌های خوب موجود در بدن شده که می‌تواند خطر بیماری‌های قلبی-عروقی را افزایش دهد. محققان همچنین در دوره هشت ساله انجام مطالعات خود مشاهده کردند این خطر در زنان بالای ۶۰ سال حدود ۳۲ درصد بیشتر است.

به گزارش روزنامه ایندپندنت، محققان آمریکایی اظهار داشتند: مصرف داروهای آنتی بیوتیک مهمترین فاکتور در تغییر توازن میکروارگانیسم‌های بدن است که باکتری‌های مفید را از بین برده و شیوع ویروس‌ها و قارچ‌های عفونی را افزایش می‌دهد.

محصول لاکتوفرم پروبیوتیکی تولید شده در شرکت زیست تخمیر، کپسولی خوراکی برای خاتم هاست که حاوی مقدار بالایی از 4 سویه باکتری سودمند دستگاه ادراری-تناسلی خاتم ها به همراه پری بیوتیک فروکتو اولیگوساکزاید (کمک کننده به رشد و فعالیت پروبیوتیک ها) می باشد و در پیشگیری و کنترل عفونت های ادراری-تناسلی در بانوان نقش بسزایی دارد. همچنین محصول لاکتوفرم موجب تعادل فلور طبیعی واژن و پیشگیری از عود مجدد عفونت های ادراری-تناسلی بانوان می شود. با مصرف این محصول می توان از استفاده بیش از حد آنتی بیوتیکها جلوگیری کرده و در نتیجه ریسک بیماری هایی همچون حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش داد.

ملونکلا